



La maladie surrénalienne du furet

Qu'est-ce que c'est?

La maladie surrénalienne du furet est une maladie hormonale fréquente, due à une hypersécrétion d'hormones sexuelles par les glandes surrénales.

Un diagnostic précis et une intervention rapide offrent à l'animal une meilleure qualité de vie et augmentent son espérance de vie.

Des avancées récentes permettent une meilleure prise en charge médicale et une prévention de cette maladie par la pose d'implants de GnRH au lieu de la stérilisation chirurgicale.



Quels sont les symptômes ?

Les signes de la maladie surrénalienne que vous pouvez surveiller sont une perte de poils pouvant être associée à des démangeaisons, un œdème de la vulve, un comportement agressif et une odeur corporelle marquée (retour du comportement sexuel).



Furet avec une maladie surrénalienne

Y-a-t-il des choses qui prédisposent à la maladie ?

La stérilisation chirurgicale est actuellement suspectée comme étant la cause principale de la maladie surrénalienne, cette maladie survenant en moyenne 3 ans après la stérilisation chirurgicale. Un autre facteur favorisant suspecté est la durée de la luminosité quotidienne. De longs cycles de lumière (supérieurs à 8 heures) favoriseraient l'apparition de cette maladie.



Comment savoir si c'est la maladie surrénalienne ?

Les symptômes ci dessus peuvent être le signe de différentes maladie.
Votre vétérinaire pourra vous orienter vers des examens complémentaires qui pourront affiner le diagnostic (dosage hormonal, raclages cutanés, échographie...)



Quelle prévention et quel traitement ?

Une contraception chimique sous forme d'implants sous-cutanés à diffusion lente, permettrait de prévenir le développement de tumeurs surrénaliennes chez le furet et serait susceptible d'éliminer les signes cliniques de la maladie, mais ne diminuerait pas la croissance de la tumeur surrénalienne. Parfois, une chirurgie est nécessaire en cas de maladie surrénalienne, elle augmente l'espérance de vie et le pronostic après chirurgie est bon.

Quel est votre rôle dans tout cela ?

-N'hésitez pas à demander des conseils à votre vétérinaire qui pourra répondre aux questions que vous vous posez sur cette maladie

Au plus près de votre petit furet vous êtes le plus à même pour être attentif au comportement de votre furet et à d'éventuelles démangeaisons et dépilations .

Vous pouvez maintenir une période de luminosité de moins de 8h par jour pour votre furet .

Les implants de GnRH sont désormais recommandés pour la stérilisation des furets et la castration chirurgicale déconseillée : parlez-en à votre vétérinaire!

La pose d'implant diminuerait plus efficacement que la castration chirurgicale l'odeur musquée du furet, ainsi que les comportements agressifs entre mâle. Elle se fait sous anesthésie flash gazeuse. La durée d'action de l'implant varie de 16 mois à 4 ans. Son efficacité s'installe sous 5 à 14 semaines.

Une fois l'implant épuisé il est inutile de l'enlever car il se résorbe et ne laisse aucun matériel sous la peau. Il est ainsi possible de réimplanter l'animal dès la fin de l'activité de l'implant précédent.



Pour plus d'informations sur la maladie surrénalienne du furet, vous pouvez aller voir ma thèse : [La maladie surrénalienne du furet](#)

Alexandra de Nazelle

Date de mise en ligne: janvier 2017